

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

®

AUVERGNE ET LIMOUSIN

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Cité Administrative, rue Pélissier

63034 Clermont Ferrand Cedex

(73) 92-42-68

BULLETIN TECHNIQUE
PUBLICATION PERIODIQUE

Grandes Cultures

Le 14 février 1985

n°1

COLZA

Une légère reprise de végétation s'amorce avec le redoux.

LARVES D'ALTISE**LARVES DE CHARANCON DU BOURGEON TERMINAL**

Un examen de vos parcelles et un éventuel traitement a été préconisé dans notre bulletin du 17 décembre dernier.

Actuellement, les infestations larvaires sont peu importantes dans l'ensemble. Les larves âgées sont sur le point de pénétrer à l'intérieur du bourgeon terminal.

PRECONISATIONS

Nous sommes maintenant en fin de période où les traitements de rattrapage sont les plus efficaces.

Si malgré tout, après examen de 25 plantes minimum les seuils suivants sont atteints, il est urgent d'intervenir avec un oléoparathion :

- Altise : 2 pieds sur 3 portant une larve
- Charançon du bourgeon terminal : 10 à 20 % de pieds colonisés

PENSEZ A L'INSTALLATION DES CUVETTES JAUNES

Dès que possible, installez vos cuvettes jaunes pour suivre l'évolution des insectes qui vont se manifester durant le printemps, particulièrement Charançons de la tige et Meligèthes et dans une moindre mesure Charançons des siliques.

Dans le champ, la cuvette (25 cm de diamètre) remplie au 2/3 d'eau additionnée de mouillant (produit vaisselle) sera placée à une dizaine de mètres de la bordure la plus proche d'un ancien champ de colza.

Le fond de la cuvette doit toujours être au niveau du sommet de la végétation.

P.A.

401047245

1985: n°1-19

DIRECTEUR-GERANT: B. MORIN

N° de série: 428

Numéro d'inscription à
la C.P.A.P.: 525 A.DRégie de Recettes de la D.D.A.
C.C.P. Clermont-Ferrand 5 503.17

ABONNEMENT

ANNUEL: 100 F

GEL

La vague de froid de Janvier dernier a eu 2 "pointes" où les températures minimales ont été très basses.

Températures minimales sous abri

Dates		8 Janvier	16 Janvier
Postes			
MOULINS	(03)	- 20,5	- 21,5
FONTANNES	(43)	- 18,0	- 23,0
MARMILHAT	(63)	- 18,0	- 22,0
VERNEUIL-/VIENNE	(87)	- 17,0	- 20,0

Globalement, les dégâts en grandes cultures sont peu importants même dans les secteurs où la couverture neigeuse était absente au moment de la première "pointe" de froid (Limagne notamment).

- Sur céréales : les feuilles sont parfois grillées (orge surtout). Les racines sont partiellement nécrosées. *Le redoux a permis une reprise de la végétation.*

- Sur colza : les grandes feuilles de la rosette sont détruites mais le "coeur" est intact. Quelques parcelles semées tardivement ont semble-t-il plus souffert.

A T T E N T I O N

Les produits phytosanitaires liquides stockés dans des locaux non chauffés ont pu subir les effets du gel.

Avant utilisation, renseignez-vous auprès de votre fournisseur ou du fabricant.